

Stres Üriner İnkontinansın Kadın Cinsel Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi

Effect of Stress Urinary Incontinence on Female Sexual Functions: Letter to the Editor

İbrahim KARACA^a

^aİzmir Ege Doğumevi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, İzmir

Geliş Tarihi/Received: 07.07.2012
Kabul Tarihi/Accepted: 28.08.2012

Yazışma Adresi/Correspondence:
İbrahim KARACA
İzmir Ege Doğumevi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, İzmir,
TÜRKİYE/TURKEY
dibrahimkaraca@hotmail.com

Anahtar Kelimeler:

Üriner inkontinans;
cinsel fonksiyon bozukluğu,
fizyolojik

Key Words: *Urinary incontinence;
sexual dysfunction,
physiological*

Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst
2012;22(4):279-80

Jinekoloji-Obstetrik derginizin 22. cildi, 2. sayısında 71-77. sayfalar arasında yayımlanmış olan “Stres Üriner İnkontinansın Kadın Cinsel Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi” başlıklı yazıyı ilgiyle okudum.¹ Öncelikle, yazarları kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen üriner inkontinansı ele aldıkları için tebrik ediyorum. Makaleyle ilgili bazı hususlara temas etmek istiyorum.

Yapılan birçok çalışmada üriner inkontinansın cinsel fonksiyon kalitesini düşürdüğü görülmüştür. Buna rağmen üriner inkontinans cerrahisi sonrası cinsel fonksiyonları değerlendiren çalışmalar kafa karıştırıcıdır. Bazı çalışmalar, operasyonların cinsel fonksiyon kalitesini iyileştirdiğini gösterse de, etkisiz olduğunu, hatta bozduğunu savunan çalışmalar da vardır.²⁻⁴ Ülkemizde yapılan ve cinsel yaşam kalitesini değerlendiren bir çalışmada, operasyon öncesi ve sonrası cinsel fonksiyonlar değerlendirilmiş; TVT yapılan grupta %73, Burch uygulanan grupta %86 oranda operasyon öncesine göre cinsel fonksiyonlar benzer bulunmuştur.⁵

Üriner inkontinans makalenizde belirtildiği gibi çoğunlukla postmenopozal kadınlarda görülmektedir. Bu yaş grubunda cinsel yaşam kalitesini, koital inkontinans bazı fizyolojik faktörlerle birlikte bozmaktadır. Operasyonlarla koital inkontinans sağlansa da, yaşlanma fizyolojisini geriye döndürmek olanaksızdır. Bu nedenle cinsel fonksiyonlarını düzeltmek umuduyla inkontinans operasyonu yaptırmak isteyen hastaların beklentileri yüksek tutulmamalıdır. Makale içerisinde üriner inkontinans cerrahisine ve sonuçlarına kısa da olsa değinilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü okurlar inkontinans cerrahi sonucu cinsel fonksiyon kalitesinin her hastada arttığı kanısına varabilirler.

Makalede üriner inkontinansın cinsel yaşam kalitesini bozan en önemli etkisi, ilişki sırasında idrar kaçırma olarak belirtilmiştir. Bu nedenle yazarlar tarafından koital inkontinanslı hastanın PISQ skorunun da bildirilmesinin çalışmanın değerini arttırmak açısından yararlı olacağını düşünmekteyim.

KAYNAKLAR

1. Hacıvelioğlu S, Alan C, Koçoğlu H, Alan H, Ersay A. [Effect of stress urinary incontinence on female sexual functions]. *Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst* 2012;22 (2):71-7.
2. Lemack GE, Zimmern PE. Sexual function after vaginal surgery for stress incontinence: results of a mailer questionnaire. *Urology* 2000;56(2):223-7.
3. Yeni E, Unal D. The effect of Tension-Free Vaginal Tape procedure on sexual function in women with stress urinary incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2003;14(6):390-4.
4. Jha S, Radley S, Farkas A, Jones G. The impact of TVT on sexual function. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2009;20(2):165-9.
5. Demirkesen O, Onal B, Tunç B, Alici B, Cetinele B. Does vaginal anti-incontinence surgery affect sexual satisfaction? A comparison of TVT and Burch colposuspension. *Int Braz J Urol* 2008;34(3):214-9.