Toxoplazma Görülme Sıklığı

THE INCIDENCE OF TOXOPIASMOSIS

Dr.Sertaç BATIOĞLU, Dr.Hasan BOZKIR, Dr.Metin BERİTAN, Dr.AİİCAMCI

Hava Hastanesi, ESKİŞEHİR

ÖZET

Toxoptazmozis yeryüzünde en sık görülen enfeksiyonlardan biridir. Kronik enfeksiyonun gebelik üzerine etkisi tartışmalı otamasına karşın, gebelikte enfeksiyon geçiren annelerin bebekleri konjenital enfeksiyon, intrauterin ölüm, prematürite ve iıtrauterin gelişme geriliği riski taşımaktadır. Akut enfeksiyon genellikle subklinik seyrettiğinden, vakaların tespiti için bütün gebelere serolojik tarama gereklidir. Literatürde seropozitiflik oranları yaşla artarak ortalama %20-50 arasında, gebelikte akut enfeksiyon geçirme oranı %0.27-1.5 arasında değişmektedir. Yöremizde ise seropozitiflik %48, gebelikte akut enfeksiyon %1 oranında gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toxoplazinosis, Gebelik

TKlin Jinekoi Obst 1992, 2:104-106

SUMMARY

Toxoplasmosis is one of the most frequent infections on the world. Although the effects of chronic infection on pregnancy are not known well, it's celar that the babies whose mothers get infetcion during pregnancy have several problems like congenital infection, intratureni death, prematurity and intrauterine growth retardation. Serologic screenign is mandatory for all pregnant women because acute maternal infection is generally subclinic and can not be detected otherwise. The incidence of seropositive cases in the USA and Europe is 20-50 % and, the incidence of acute infection during pregnancy is 0.27-1.5%. The rates in our city are 48 % for seropositive cases and 1 % for acute infection. During pregnamay.

Key Words: Toxoplasmosis, Pregnancy

Anatolian J Gynecol 1992, 2:104-106

Toxoplazmozis, zorunlu bir hücre içi protozoan olan Toxoplazma gondii ile meydana gelen bir enfeksiyon hastalığıdır. T. gondii koksidiyalar arasında yer alan bir mikroorganizma olup, trofozoid, doku kisti ve sadece kedigiller familyasının barsak mukozasında oluşan ookist formu ile üç formu vardır (1). Önceden geçirilen enfeksiyson, immüniteyi geliştirir ve gebelikte enfeksiyonu önler (2). Primer enfeksiyon gebelik sırasında geçirilirse, plasentadaki fokusdan yayılan patojen, gelişmekte olan fetusu enfekte edebilir (2). Primer maternal enfeksiyon sırasında fetal enfeksiyon riski yaklaşık %50'dir (ilk trimesterde *%\5,* üçüncü trimesterde %70) (2). Çok erken gestasyonel yaşda, abortion kaçınılmazdır. Eğer enfeksiyon daha sonraları gelişirse, özellikle Il.trimestirde fetal hasar meydana gelebilir (2).

Toxoplazma yeryüzünde en sık görülen enfeksiyonlardan biridir. Bu çalışmamamızda, bazı araştırmalarda kadınlarda tespit edilen #36.7-47.8 oranlarının, çalışma bölgemizdeki değeri araştırılmıştır.

Geliş Tarihi: 1.3.1992 **Kabul Tarihi: 14.3.1992**

Yazışma Adresi: Dr.Sertaç BATIOGLU
Hava Hastanesi, ESKİŞEHİR